



Nab-PTX (nanoparticle albumin-bound PACLitaxel)

## triweekly アブラキサン単独療法(アルブミン結合 パクリタキセル)

page 1 of 2

患者名: 患者 ID: 身長: 体重: (月 日測定)

主治医: 指導医: 年齢: 体表面積: CREA: (月 日採血)

### CHEMOTHERAPY REGIMEN

1サイクルを21日とし、3週間に1回投与を PD (progressive disease) となるまで繰り返す。

		day1	day8	day15	day22	...
アブラキサン(パクリタキセル)	260mg/m <sup>2</sup>	↓			↓	
催吐性リスク			軽度		軽度	

① 生理食塩液 100ml 1本  
デカドロン 6.6mg 1V  
30分かけて点滴(200ml/hr)

② 生理食塩液 100ml 1本  
アブラキサン 260mg/m<sup>2</sup> 100mg( )本  
30分かけて点滴

生理食塩水 100ml を準備しますが、  
1バイアル 100mg につき、20ml が最終の液量となります。  
例) 400mg=全量 80ml  
投与 mg 数にかかわらず点滴時間 30 分を指定されているので、  
時速は投与量によって変わります。

③ 生理食塩液 50ml 1本  
全開で滴下

アルブミンが血漿分画製剤です。  
1回の点滴につき、3~6枚の複写式血漿分画製剤伝票と 20 年の使用記録保存が必要です。

### REFERENCES:

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ Breast Cancer. V.1.2010.

Gradishar WJ, et al. J Clin Oncol. 2005;23(31):7794-803.