悪性リンパ種 Follicular Lymphoma

G（Obinutuzumab）

ガザイバ維持療法（オビヌツズマブ）

患者名：　　患者 ID：　　身長：　　体重：　　（　　月　　日測定）

主治医：　　指導医：　　年齢：　　体表面積：　　CREA：　　（　　月　　日採血）

CHEMOTHERAPY　REGIMEN

導入療法後に、単独で2カ月に1回、最大2年間投与を繰り返す

		day1　day2　day3　day4
ガザイバ（オビヌツズマブ）	1000mg/body	↓
催吐性リスク		最小度

day1

前投薬）点滴開始時に内服
アセトアミノフェン 200mg　2錠

生理食塩液 100ml　1本
サクシゾン 100mg1V
ポララミン 5mg　1A
15分かけて点滴（別々に混注すること）

生理食塩液 250ml　1本
ガザイバ 1000mg　1本
30ml/h で開始し、30分ごとに＋30ml/hずつ増速できる。
最大120ml/hまで増速できる。（約3時間15分）

生理食塩液 50ml　1本
500ml/h

REFERENCES:

Obinutuzumab for the First-Line Treatment of Follicular Lymphoma
N Engl J Med 2017; 377:1331-1344

制吐剤について：日本癌治療学会　制吐剤適正使用ガイドライン

履歴：2021年1月レジメン審査委員会承認