



# CDDP+CPT11 療法 (シスプラチン+カンプト) Short Hydration4時間

患者名: \_\_\_\_\_ 患者 ID: \_\_\_\_\_ 身長: \_\_\_\_\_ 体重: \_\_\_\_\_ ( 月 日測定)

主治医: \_\_\_\_\_ 指導医: \_\_\_\_\_ 年齢: \_\_\_\_\_ 体表面積: \_\_\_\_\_ CREA: \_\_\_\_\_ ( 月 日採血)

B型肝炎ウイルス: HBs 抗原 (+・-) HBs 抗体 (+・-) HBc 抗体 (+・-) HBV-DNA 定量 ( \_\_\_\_\_ ・陰性)


## CHEMOTHERAPY REGIMEN

1クールを4週間として4回繰り返す。

		day1	day8	day15
カンプト(イリノテカン)	60mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	↓
シスプラチン(シスプラチン)	60mg/m <sup>2</sup>	↓	...	...
催吐性リスク		高度	中等度	中等度

## day1

処方) イメンドカプセルセット 1セット  
点滴開始までに内服すること。  
day2、day3 は午前中に内服すること。



処方) デカドロン錠4mg 2錠 2×朝昼食後3日分  
点滴翌日から3日間内服

次ページへ続く



**CDDP+CPT11 療法**(シスプラチン+カンプト)  
Short Hydration4時間

day1

※初日から3日目まで、少なくとも1日1リットルの飲水を促すこと。

day8,15 共通

大塚生食注 100ml 1本  
アロキシ 0.75mg 1V  
デキサート 6.6mg 1V  
デキサート 1.65mg 2A  
30分かけて点滴

大塚生食注 250ml 1本  
カンプト 100mg( )本  
カンプト 40mg( )本  
90分かけて点滴

生理食塩液 50ml 1本  
全開で滴下

処方)デカドロン錠4mg 2錠 2×朝昼食後2日分  
点滴翌日から2日間内服

REFERENCES:

Irinotecan plus cisplatin compared with etoposide plus cisplatin for extensive small-cell lung cancer.

*N Engl J Med.* 2002 Jan 10;346(2):85-91. JCOG9511

Phase III Trial of Irinotecan/Cisplatin Compared With Etoposide/Cisplatin in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer : Clinical and Pharmacogenomic Results From SWOG S0124

*J Clin Oncol* 27:2530-2535 2009