膀胱

Gemcitabine/CARBOplatin

GEM（ゲムシタビン）
＋CBDCA（パラプラチン）

~~パラプラチンは尿路上皮癌に適応外使用となります~~. →備考

患者名：　　患者カルテ ID：　　身長：　　cm 体重：　　kg

主治医：　　指導医：　　年齢：　　体表面積：　　㎡

CHEMOTHERAPY　REGIMEN

1 サイクルを 21 日とする。ゲムシタビンは 1 週間に 1 回投与を 2 回繰り返し、続く 1 週間を休薬する。
パラプラチンは 3 週間に 1 回投与する。

		day1	day8	day15	day22	…
ゲムシタビン	1000mg/㎡	↓	↓		↓	
パラプラチン（カルボプラチン）	AUC5	↓			↓	

Day1

※嘔吐リスク：
day1　中等度（Moderate）
day8　軽度（Low）

①
生食 100ml　1 本
デキサート 6.6mg　1 本
アロキシ 0.75mg　1 本
---
30 分（200ml/h）

②
5%大塚糖液 100ml　1 本
ゲムシタビン　1000mg/㎡　200mg（　　）本
1g　（　　）本
---
30 分（200ml/h）

③
生食 250ml　1 本
パラプラチン　AUC5　50mg（　　）本
150mg（　　）本
450mg（　　）本
---
75 分（200ml/h）

④
生食 50ml　1 本

全開で

処方箋：
Rp1　デカドロン錠 4mg（　2　）錠　2×（二）朝昼食後
コメント：点滴の翌日と翌々日に内服

次ページへ続く

GEM（ゲムシタビン）
＋CBDCA（パラプラチン）

Day8

①
生食 100ml　1 本
デキサート 6.6mg　1 本
- -
30 分（200ml/h）

②
5%大塚糖液 100ml　1 本
ゲムシタビン　1000mg/㎡　200mg（　　）本
1g　（　　）本
- -
30 分（200ml/h）

③
生食 50ml　1 本
- -
全開で

REFERENCES:

EORTIC　Study30986

Randomized Phase II/III Trial Assessing Gemcitabine / Carboplatin and Methotrexate / Carboplatin / Vinblastine in Patients With Advanced Urothelial Cancer “Unfit” for Cisplatin-Based Chemotherapy: Phase II—Results of EORTC Study 30986

Maria De Santis, et al. *J Clin Oncol.* 2009 ;27(33) :5634-5639

備考：　※平成26年2月24日パラプラチンは保険適応となりました.（保医発0224第2号）添付文書には記載ありませんが、審査情報提供検討委員会により審査情報提供されております。