膀胱癌

TIN (Paclitaxel/ Nedaplatin/Ifosfamide)

TIN 療法（タキソール+アクプラ+イホマイド）

患者名：　　患者 ID：　　身長：　　体重：　　（　　月　　日測定）

主治医：　　指導医：　　年齢：　　体表面積：　　CREA：　　（　　月　　日採血）

CHEMOTHERAPY　REGIMEN

28 日を 1 クールとし繰り返す。

		day1	day2	day3	…
タキソール（パクリタキセル）	175mg/m^2	↓			
アクプラ（ネダプラチン）	70mg/m^2	↓			
イホマイド（イホスファミド）	1.5g/m^2	↓	↓	↓	

day-1

ヴィーン D　500ml　1 本
主管①持続　深夜 0 時まで

day1

ヴィーン D　500ml　1 本
主管①5 時間　深夜 0 時～午前 5 時

ヴィーン D　500ml　1 本
主管②5 時間　午前 5 時～午前 10 時

催吐性リスク：中等度（Moderate）

イメンドカプセル　1 セット（3 日分で 1 セット）　点滴③開始時に内服する。day2,3 は午前中に内服する。
レスタミンコーワ錠　5 錠　点滴③開始時に内服する。

入院と外来では診療区分が違います。
入院患者は「内服」、外来患者は「処置」
（イメンドカプセルセット・レスタミン錠）

グラニセトロン 3mg100ml　1 袋
デキサート 6.6mg　2 本 ｝ 16.5mg
デキサート 1.65mg　2 本 ｝
ガスター20mg　1 本
側管③30 分

テルモ生食　500ml
タキソール 100mg（　　）本
タキソール 30mg（　　）本
主管④180 分　10 時～13 時

タキソール 175mg×体表面積（　　）
＝（　　）mg/body

20%マンニットール 300ml　1 本
主管⑤60 分(300ml/hr)　13 時～14 時

テルモ生食　500ml
アクプラ 50mg（　　）本
アクプラ 10mg（　　）本
主管⑥60 分　14 時～15 時

アクプラ 70mg×体表面積（　　）
＝（　　）mg/body

TIN (Paclitaxel/ Nedaplatin/Ifosfamide)

TIN 療法（タキソール+アクプラ+イホマイド）

生食 50ml　1 本
ウロミテキサン 400mg（　　）本
ウロミテキサン 100mg（　　）本
主管⑦全開

※イホマイド直前・4 時間後・8 時間後
ウロミテキサン 300mg×体表面積（　　）
＝（　　）mg/回

テルモ生食 500ml
イホマイド 1g（　　）本
主管⑧180 分　15 時頃～18 時頃

イホマイド 1.5g×体表面積（　　）
＝（　　）mg/body

ヴィーン D　500ml　1 本
メイロン 8.4%　20ml　1 本
主管⑨持続　360 分

生食 50ml
ウロミテキサン 400mg（　　）本
ウロミテキサン 100mg（　　）本
側管⑩全開　19 時

※イホマイド直前・4 時間後・8 時間後
量は 3 回とも同じ

生食 50ml
ウロミテキサン 400mg（　　）本
ウロミテキサン 100mg（　　）本
側管⑪全開　23 時

※イホマイド直前・4 時間後・8 時間後
量は 3 回とも同じ

ひきつづき day2 へ

day2

ヴィーン D　500ml　1 本
メイロン 8.4%　20ml　1 本
主管①持続　360 分　深夜 0 時～午前 6 時

ヴィーン D　500ml　1 本
メイロン 8.4%20ml　1 本
主管②持続　360 分　午前 6 時～昼 12 時

グラニセトロン 3mg100ml　1 袋
デキサート 6.6mg 1 本
側管③30 分

生食 50ml　1 本
ウロミテキサン 400mg（　　）本
ウロミテキサン 100mg（　　）本
主管④全開

※イホマイド直前・4 時間後・8 時間後
ウロミテキサン 300mg×体表面積（　　）
＝（　　）mg/回

TIN (Paclitaxel/ Nedaplatin/Ifosfamide)

TIN 療法（タキソール+アクプラ+イホマイド）

テルモ生食 500ml　1 本
イホマイド 1g（　　）本
主管⑤180 分　12 時頃～15 時頃

イホマイド 1.5g×体表面積（　　）
＝（　　）mg/body

ヴィーン D　500ml　1 本
メイロン 8.4%　20ml　1 本
主管⑥持続　180 分

生食 50ml　1 本
ウロミテキサン 400mg（　　）本
ウロミテキサン 100mg（　　）本
側管⑦全開　16 時

※イホマイド直前・4 時間後・8 時間後
量は 3 回とも同じ

ヴィーン D　500ml　1 本
メイロン 8.4%　20ml　1 本
主管⑧持続　180 分

生食 50ml　1 本
ウロミテキサン 400mg（　　）本
ウロミテキサン 100mg（　　）本
側管⑨全開　20 時

※イホマイド直前・4 時間後・8 時間後
量は 3 回とも同じ

21 時ごろ終了

day3

ヴィーン D　500ml　1 本
メイロン 8.4%　20ml　1 本
主管①持続　180 分　午前 9 時～午前 11 時

生食 100ml　1 本
アロキシ 1 本
デキサート 6.6mg 1 本
側管②30 分

生食 50ml　1 本
ウロミテキサン 400mg（　　）本
ウロミテキサン 100mg（　　）本
主管③全開

※イホマイド直前・4 時間後・8 時間後
ウロミテキサン 300mg×体表面積（　　）
＝（　　）mg/回

テルモ生食 500ml　1 本
イホマイド 1g（　　）本
主管④180 分　午前 11 時頃～14 時頃

ヴィーン D　500ml　1 本
メイロン 8.4%　20ml　1 本
主管⑤持続　180 分

TIN (Paclitaxel/ Nedaplatin/Ifosfamide)

TIN 療法（タキソール+アクプラ+イホマイド）

生食 50ml　1 本
ウロミテキサン 400mg（　　）本
ウロミテキサン 100mg（　　）本
側管⑥全開　15 時

※イホマイド直前・4 時間後・8 時間後
量は 3 回とも同じ

ヴィーン D　500ml　1 本
メイロン 8.4%　20ml　1 本
主管⑦持続　180 分

生食 50ml　1 本
ウロミテキサン 400mg（　　）本
ウロミテキサン 100mg（　　）本
側管⑧全開　19 時

※イホマイド直前・4 時間後・8 時間後
量は 3 回とも同じ

20 時ごろ終了

day4～

補液は必要時に適宜追加する

※イホマイド、及び、ウロミテキサンはいずれも当院採用薬ではありません。
事前に薬剤部長の許可を得、「未採用薬品購入申請書」にて申請を行った上でオーダーしてください。
※~~タキソールは尿路上皮癌へ適用外使用となります~~~~のでご注意ください。~~
※平成26年2月24日タキソールは保険適応となりました.（保医発0224第2号）

REFERENCES:

Paclitaxel, ifosfamide, and nedaplatin as second-line treatment for patients with metastatic urothelial carcinoma: a phase II study of the SUOC group.
Kitamura H,et al.*Cancer sci*,2011 Jun;102(6):1171-5.