



XELOX (Capecitabine/OXAlIplatin) +Bevacizumab
XELOX (ゼローダ／エルプラット) +アバスチン

page1 of 3

患者名： 患者カルテ ID： 身長： cm 体重： kg

主治医： 指導医： 年齢： 体表面積： m^2

1サイクルを21日として繰り返す

CHEMOTHERAPY REGIMEN		day1	day2	day3	…	day15	~day21
5HT3A+DEX	13.2mg	前処置	↓				
アバスチン (ベバシズマブ)	7.5mg/kg	↓			…		
エルプラット (オキサリプラチン)	130mg/ m^2	↓			…		
ゼローダ (カペシタビン) 錠	別表参照	タ→	→	→	→→→	→朝	休薬期間
デカドロン錠4mg	内服	-	8mg	8mg	…		

①

生食 100ml
アロキシ 0.75mg 1本
デキサート 6.6mg 2本

30分で点滴

※嘔吐リスク
day1 中等度(Moderate)
day2 以降 軽度(Low)

②

生食 100ml
アバスチン 400mg () 本
アバスチン 100mg () 本

初回90分かけて点滴
2回目60分
3回目以降30分

※アバスチン
7.5mg × () kg = () mg

※忍容性が良好であれば点滴時間を短縮できる

③

5%大塚糖液 250ml
エルプラット 100mg () 本
エルプラット 50mg () 本

2時間かけて点滴

※エルプラット
130mg × () m^2 = () mg

④

生食 50mL 1本

全開で滴下

処方箋：

Rp1 デカドロン錠4mg 2錠 2×(二) 朝食後
コメント：点滴の翌日と翌々日に内服

Rp2 ゼローダ錠 300mg () 錠 2×(十四) 朝夕食後
コメント：点滴した日の夕方から内服開始し、飲みきり終了

別表

体表面積	1回用量
1.36 m^2 未満	1,200mg (4錠)
1.36 m^2 以上 1.66 m^2 未満	1,500mg (5錠)
1.66 m^2 以上 1.96 m^2 未満	1,800mg (6錠)
1.96 m^2 以上	2,100mg (7錠)

※1回の量なので
1日量はこの2倍となる。

次ページへ続く



XELOX (Capecitabine/OXAlIplatin) +Bevacizumab
XELOX (ゼローダ／エルプラット) +アバスチン

page2of3

REFERENCES:

- 1.NCCN Clinical Practice Guidelines inOncology™ Rectal Cancer. V.3.2009.
- 2.Cassidy J, et al. *J Clin Oncol.* 2004;22(11):2084-91.
- 3.Abdalla EK, et al. *Clin Colorectal Cancer.* 2006;5(6):436-9.