



IP (Irinotecan/CISplatin)

CPT-11+CDDP (カンプト/ランダ)

患者名： 患者カルテ ID： 身長： cm 体重： kg

主治医： 指導医： 年齢： 体表面積： m²

CHEMOTHERAPY REGIMEN

1 サイクルを 28 日とし6回繰り返す。カンプトは 1 週間に 1 回投与を 3 回繰り返す、続く 1 週間は嗅薬する。ランダは 4 週間に 1 回投与する。

		day1	day8	day15	day22	day29	...
カンプト (イリノテカン)	60mg/m ²	↓	↓	↓	...	↓	...
シスプラチン	60mg/m ²	↓	↓	...

Day1

① アセトキープ 3G 500ml 1 本

60 分 (500ml/h)

②前処置内服 Rp1 イメンドカプセルセット 1 セット

点滴④開始時に 125mg 1 カプセルを内服する
残りは点滴翌日と翌々日の午前中に内服する

③ グラニセトロン 3mg 1 袋
デカドロン 6.6mg 1 本 } 9.9mg
デカドロン 1.65mg 2 本 }

30 分 (200ml/h)

※嘔吐リスク：
day1 高度 (High)
day8,15 中等度 (Moderate)

④ 生食 500ml 1 本
カンプト 60mg/m² 40mg () 本
100mg () 本

60 分

⑤ 20%マンニトール 1 本

36 分 (500ml/h)

⑥ テルモ生食 500ml 1 本
ランダ 60mg/m² 10mg () 本
50mg () 本

60 分 (500ml/h)
全量 500ml とせよ

次ページへ続く



IP (Irinotecan/CISplatin)

CPT-11+CDDP (カンプト/シスプラチン)

page2of3

⑦ アセトキープ 3G 500ml 1本

60分 (500ml/h)

⑧ 処方箋：
Rp1 デカドロン錠4mg (2) 錠 2× (三) 朝昼食後
コメント：点滴翌日より3日間内服

Day8,Day15

① 生食 100ml 1本
デカドロン 6.6mg 1本 } 9.9mg
デカドロン 1.65mg 2本 }
アロキシ 0.75mg 1本

30分 (200ml/h)

※嘔吐リスク：
day1 高度 (High)
day8,15 中等度 (Moderate)

② 生食 250ml 1本
カンプト 60mg/m² 40mg () 本
100mg () 本

90分

③ 生食 50ml

全開で滴下

④ 処方箋：
Rp1 デカドロン錠4mg (2) 錠 2× (二) 朝昼食後
コメント：点滴の翌日と翌々日に内服

REFERENCES:

Sugiyama, T., M. Yakushiji, and T. Kamura. "Japan CPT-11 Study Group et al (2002) Irinotecan (CPT-11) and cisplatin as first-line chemotherapy for advanced ovarian cancer." *Oncology* 63: 16-22.